



Sistema de Estimaciones Agrícolas del Centro Norte de la Provincia de Santa Fe



INFORME DE LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

“Sistema de Estimaciones Agrícolas del Centro - Norte de la Provincia de Santa Fe”

INFORME

Situación 24/07/2019 al 30/07/2019

- N° 426 -

Con los auspicios de:



“Maíz de segunda, aún no se cosechó el 35 % y el proceso de trilla estuvo paralizado”

Semana caracterizada por los altos porcentajes de humedad ambiente, nubosidad, lloviznas, nieblas, neblinas y precipitaciones de bajas intensidades y con duración de varias horas, en toda el área de estudio. Con montos pluviométricos de cierta importancia para la época invernal, los que fluctuaron entre 05 a 55 mm, con una distribución geográfica homogénea. Siendo los departamentos del centro y del norte santafesino donde se registraron los mayores valores.

Dichas condiciones ambientales paralizaron el proceso de cosecha de maíz de segunda, pero favorecieron el crecimiento normal y óptimo desarrollo de los cultivares de trigo.

A días del inicio de un nuevo ciclo agrícola, de cosecha gruesa, campaña 2019/2020, el primer actor que intervendría sería el girasol, el cual a la fecha presentó una realidad muy calma, no despertando o reflejando el interés en repetir el área de siembra. Los sondeos y relevamientos realizados mostraron indicadores tales como: bajo a medio interés, baja demanda de insumos, precios comerciales poco tentativos y rentabilidad acotada, todo lo mencionado llevaría a una intención de siembra inferior a la campaña 2018/2019.

La tarea realizada en la semana fue:

a) monitoreo y seguimiento de cultivares de trigo.

Para el período comprendido entre el miércoles 31 de julio al martes 06 de agosto de 2019, los pronósticos prevén desde su inicio, condiciones de estabilidad climática, totalmente despejado, soleado, con estabilidad en las temperaturas medias y mínimas, alguna probabilidad de ocurrencia de heladas débiles en los diferentes departamentos del área de estudio. Situación que al comienzo del día jueves 01 podría revertirse, con manifestaciones de inestabilidad climática, con altas probabilidades de precipitaciones de bajas intensidades y lloviznas, condición que duraría un día.

A posteriori, condiciones de estabilidad climática, soleado, escasa a nula nubosidad y progresivo descenso de las temperaturas mínimas, con alta probabilidad de ocurrencia de sucesivas heladas, algunas de ellas de importancia, dichas condiciones se mantendrían hasta el final del período.

Las temperaturas medias diarias fluctuarían en toda el área, entre mínimas de 1 a 10 °C y máximas de 15 a 24 °C. -

Maíz total (campaña 2018/2019)

✓ La superficie sembrada fue de 184.500 ha.

Unas 89.000 ha, correspondieron a los lotes sembrados en primera instancia, denominado maíz de primera, el cual de acuerdo al área de estudio tuvo dos usos, un porcentaje a grano para futura venta comercial y el otro porcentaje como forraje, para consumo animal bovino.

Otras 95.500 ha, correspondieron a las parcelas sembradas en segunda instancia, denominado maíz de segunda o tardío.

Maíz temprano (de primera)

✓ Campaña 2018/2019, la superficie sembrada fue de 89.000 ha, superficie cosechada (grano comercial) 66.700 ha, con un rendimiento promedio de 95 qq/ha y una producción de 633.650 tn. -

Maíz tardío (de segunda)

✓ Semana sin actividades, el proceso de cosecha totalmente paralizado, aunque hubo un par de días con algunas horas soleadas al final de la misma. En toda el área de estudio las condiciones ambientales con altos porcentajes de humedad ambiente, lloviznas y precipitaciones condicionaron toda la recolección.

La semana anterior, la trilla había avanzando lentamente y con porcentajes de humedad de grano entre valores de 16 y 18 %.

Con el transcurso de los días ya no se reflexionó, ante posibles costos de secado, sino la posibilidad de ingreso a los lotes y la concreción de la cosecha.

El estado sanitario del cultivo fue bueno, con leves manifestaciones de deterioro de granos, mazorcas caídas y presencia de hongos, con muy bajo impacto hasta el momento.

Los rendimientos obtenidos fueron los siguientes:

- en los departamentos del sur, el rendimiento promedio fluctuó entre 75 a 95 qq/ha, con lotes puntuales de 100 qq/ha,
- en los departamentos del centro, el rendimiento promedio fluctuó entre 60 a 80 qq/ha, con lotes puntuales de 95 qq/ha,
- en los departamentos del norte, el rendimiento promedio fluctuó entre 40 a 58 qq/ha, con lotes puntuales de 70 qq/ha.

El estado fenológico de los cultivares observado fue en R “estados reproductivos” R₆ (madurez fisiológica). -



Lote de maíz tardío, en R₆ (madurez fisiológica), con estructuras de plantas debilitadas, caídas, sin condiciones de piso para el proceso de cosecha, en el centro este del departamento *General Obligado*. -



Lote de maíz tardío, en R₆ (madurez fisiológica), con 23 % de humedad de grano, en condiciones buenas, con algunas mazorcas caídas, en el centro del departamento *Las Colonias*. -

Trigo

✓ Los cultivares continuaron su crecimiento y desarrollo sin inconvenientes, bajo condiciones ambientales óptimas: con buena a muy buena disponibilidad de agua útil en los suelos, temperaturas diarias medias a bajas. Las precipitaciones de bajas intensidades y de montos pluviométricos considerables, generaron condiciones óptimas a excelentes para la presente campaña.

Por lo cual se observó un 97 % del cultivo en estado bueno a muy bueno con lotes excelentes, un 2 % en estado bueno a levemente regular y un 1 % en estado regular.

Continuó detectándose en ciertas variedades, susceptibles a enfermedades, la presencia de mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis*) y roya de la hoja o anaranjada (*Puccinia recondita*), dicha situación fue de baja incidencia o escala.

Debería resaltarse el rol e importancia del monitoreo y seguimiento continuo del cultivo en este período.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: 0 "germinación", 07 (emergencia del coleóptilo), 09 (hoja en el extremo del coleóptilo), 1 "crecimiento de la planta" 11 (primera hoja desarrollada) 12 (dos hojas desarrolladas) 13 (tres hojas desarrolladas), 14 (cuatro hojas desarrolladas), 2 "macollaje" 21 (un tallo principal y un macollo), 23 (un tallo principal y tres macollos), 25 (un tallo principal y cinco macollos) y en lotes más avanzados en 27 (un tallo principal y siete macollos). -



Lote de trigo, sobre rastrojo de maíz en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, con buena disponibilidad de agua útil en el suelo y óptima densidad de plantas, en el centro del departamento *Las Colonias*. -




Lote de trigo, con un óptimo crecimiento y desarrollo, con muy buena densidad de plantas y uniformidad, en el suroeste del departamento *Castellanos*. -

Mapa n° 1:
Agua Útil (AU) (00 - 20 cm)

En la superficie total del área de estudio, constituida por los doce departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe, se observó muy buena disponibilidad de agua útil en los primeros centímetros 00 - 20 de los suelos, como consecuencia de las condiciones ambientales y precipitaciones que se registraron en la semana.

Ante ello, han variado las áreas y los sectores saturados a sobresaturados, observándose un aumento de áreas y sectores con encharcamiento y lotes afectados, en todos los departamentos que constituyen el área de estudio. Ver mapa.

Los perfiles cargados de agua, continuarían transmitiendo tranquilidad y muy buenas perspectivas para el **seguro** desarrollo, crecimiento y transcurso de la campaña de la cosecha fina. -



=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores ubicados en los distintos departamentos del área de estudio centro - norte de la Provincia de Santa Fe. -