

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 792 -

Período: 26/8/2026 al 1/9/2026


AUSPICIAN



“Actividades agrícolas a pleno, en el área de estudio del SEA, como consecuencia de las mejores condiciones climáticas”




♦ *Lote con rastrojo de soja temprana, en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera), en el centro del departamento Castellanos.*



♦ *Gráfico de la intención de siembra de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lote roturado, en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua útil, en el centro del departamento General Obligado.*



♦ **Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.**



♦ **Lote con trigo, variedad ciclo largo, excelente estado, en pleno proceso de macollaje e inicio de encañazón, en el centro del departamento Castellanos.**



♦ **Lote con maíz tardío (de segunda), en etapa R6 (madurez fisiológica), buen estado, en el centro del departamento Castellanos.**



♦ *Lotes con algodón, en etapa de fin de maduración, pleno proceso de cosecha, estado bueno a regular, suelos totalmente saturados, anegados, en el este del departamento Nueve de Julio.*

Imágenes de:

- **maíz temprano (de primera):**
 - en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera),
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **girasol:**
 - en pleno proceso de siembra, muy buena disponibilidad de agua útil,
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **trigo:**
 - variedad ciclo largo, excelente estado, en pleno proceso de macollaje e inicio de encañazón;
- **maíz tardío (de segunda):**
 - en etapa R6 (maduración fisiológica), buen estado y
- **algodón:**
 - en etapa de fin de maduración, pleno proceso de cosecha, estado bueno a regular, **suelos totalmente saturados, anegados.**

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 26/8/2026 hasta las 20 h del 1/9/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias, despejado, parcialmente nublado, progresivamente aumentó la nubosidad y a mediado o fines del jueves 28, precipitaciones débiles, de muy bajas intensidades, lloviznas que alternaron con horas de estabilidad y soleado hasta mediado o fines, del lunes 31.

Luego, cambió a cielo despejado, estabilidad, buen tiempo y con descenso de las temperaturas, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 6 a 20 °C y máximos de 17 a 30 °C.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las actividades agrícolas. Lentamente se observó mayor movimiento de equipos o maquinarias que, con el transcurso de los días se incrementó.

Además, durante cuatro o cinco jornadas, según zonas, reinaron situaciones de estabilidad climática que posibilitaron: cosecha de maíz tardío, cosecha de algodón, siembra de girasol, siembra de maíz temprano, aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y los debidos monitoreos o controles.



Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió 106.100 ha.

Período estable climáticamente, que posibilitó el avance de la cosecha de la oleaginosa, en la medida en que las condiciones físicas de los suelos se recuperaron y siempre, según las decisiones de los productores.

- En la **zona este algodонера**, la recolección alcanzó el 98 % del total implantado, con un avance de 0,5 punto intersemanal.
- En la **zona oeste algodонера**, muy puntualmente, la situación mejoró, particularmente en los lotes bajos con distintas realidades, que de acuerdo a las evaluaciones particulares se ingresó y se recolectó, o no. Pero, los algodones que no se recogieron, generaron nuevas pérdidas económicas.

Hasta la fecha y bajo dichas realidades, los últimos rendimientos fueron muy variables, se redujeron, siempre en equilibrio con la zona. Fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos que alcanzaron los 3.000 kg/ha.



Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de 89.000 ha, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.

Los escenarios climáticos registrados, ambientes más secos después de un par de días con precipitaciones débiles, de bajas intensidades, hicieron que el ritmo de la cosecha aumente.

Los porcentajes de humedad de los granos, algo elevados y que oscilaron desde 15 hasta 18 %, fueron los que regularon el ritmo de la trilla, la que igualmente avanzó paulatinamente.

Los rendimientos promedios logrados hasta el momento no variaron y oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.



Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.

Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de aplicación de fertilización nitrogenada, seguimiento, control o evaluación, según zonas y el posible acceso a los lotes.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de maíz tardío,
- cosecha de algodón,
- aplicación de fertilizantes,
- siembra de girasol,
- siembra de maíz temprano (de primera),
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 2 y el 8 de septiembre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, temperaturas medias, despejado, parcialmente nublado, progresivamente aumentaría la nubosidad en un bajo porcentaje, descenso sostenido de las temperaturas medias y altas probabilidades de heladas, el domingo 6 y el lunes 7.

Dicha estabilidad, buen tiempo y con descenso de las temperaturas, se mantendría hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 1 a 15 °C y máximos de 11 a 28 °C.

TRIGO

Los triguales, evolucionaron en su ciclo de manera normal, dadas las óptimas características de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, inicio de encañazón, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

No varió el área de los cultivos en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos de las parcelas. Pero, muy lentamente la realidad se modificó porque disminuyeron los encharcamientos.

La coloración de los triguales, de un verde intenso a un verde amarillento se mantuvo.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ *Lote con trigo; variedad ciclo largo, excelente estado, en desarrollo vegetativo, en el centro del departamento Las Colonias.*

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 01/9/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo, macollaje e inicio de encañazón.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, por las condiciones de estabilidad climática, escasas precipitaciones débiles, lloviznas con bajo impacto sobre la superficie, **muy lentamente se reversionaron los escenarios** encharcados o anegados, en distintas posiciones topográficas del SEA.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 – 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían, las distintas y variables planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.

=====
Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.