

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 791 -

Período: 19/8/2026 al 25/8/2026

AUSPICIAN



San Cristóbal
SEGUROS, EN CASA


 **la segunda**
SEGUROS

 **SANCOR
SEGUROS**

“Comenzó la siembra de maíz temprano y lentamente, retomaron su ritmo las actividades agrícolas”




- ♦ *Lote con rastreo de soja temprana, en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera), en el centro sur del departamento Las Colonias.*



- ♦ *Gráfico de la intención de siembra de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



- ♦ *Lote roturado, en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua útil, en el centro sur del departamento General Obligado.*



♦ **Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.**



♦ **Lote con trigo, variedad ciclo largo, excelente estado, en pleno proceso de aplicación de fungicida, en el centro oeste del departamento Castellanos.**



♦ **Lotes con maíz tardío (de segunda), en etapa R6 (madurez fisiológica), buen estado, en el centro del departamento Castellanos.**



♦ *Lote con algodón, en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, **suelo totalmente anegado**, en el sureste del departamento Nueve de Julio.*

Imágenes de:

- **maíz temprano (de primera):**
 - *en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera),*
 - *gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;*
- **girasol:**
 - *en pleno proceso de siembra, muy buena disponibilidad de agua útil,*
 - *gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;*
- **trigo:**
 - *variedad ciclo largo, excelente estado, en pleno proceso de aplicación de fungicida;*
- **maíz tardío (de segunda):**
 - *en etapa R6 (maduración fisiológica), buen estado y*
- **algodón:**
 - *en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, **suelo totalmente anegado**.*

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 19/8/2026 hasta las 20 h del 25/8/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó inestable, temperaturas medias a bajas, totalmente nublado, precipitaciones débiles, de bajas intensidades y lloviznas, hasta fines del jueves 20 o inicios del viernes 21.

Luego, cambió a cielo parcialmente cubierto, despejado, estabilidad, buen tiempo, con descenso de las temperaturas y heladas, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 3 a 11 °C y máximos de 11 a 24 °C.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las actividades agrícolas. Luego de cuatro a cinco días de inestabilidad y alto porcentaje de humedad, se revirtieron las características climáticas. Lentamente, comenzó a observarse el movimiento de equipos o maquinarias que retomaron las actividades paralizadas: cosecha, siembra y aplicaciones, en gran parte del área evaluada.

Durante dos o tres días, según zonas, reinó estabilidad climática, que permitió: cosecha de maíz tardío, siembra de girasol, monitoreo, control, aplicaciones de fungicidas, fertilizantes y se **inició la siembra de maíz temprano**.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Semana sin avance en la recolección. En la totalidad de la zona oeste fue nulo debido a precipitaciones débiles, lloviznas, elevada humedad ambiente y en el suelo, falta de piso e intransitabilidad.

El nuevo retraso en el proceso afectó y afectaría la calidad de la fibra y reduciría nuevamente los rendimientos.

- En la **zona este algodonera**, la recolección alcanzó el 97,5 % del total implantado, sin avance intersemanal.
- En la **zona oeste algodonera**, la situación continuó con lotes anegados; no se ingresó y no se cosecharon. Los cultivares que no se recolectaron se evaluarían y determinarían, las pérdidas sufridas.

Hasta la fecha y bajo dichas condiciones, los últimos rendimientos fueron muy variables, se redujeron, siempre en equilibrio con la zona. Fluctuaron desde mínimos de 500 kg/ha a máximos, que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Las situaciones climáticas registradas, precipitaciones de muy baja intensidad, irregular monto pluviométrico, ambientes húmedos y luego, más secos, hicieron que en el sur y centro del área de estudio, el ritmo de cosecha mejore paulatinamente.

Los rendimientos promedios logrados hasta el momento no variaron y oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de aplicación de fungicidas y fertilización nitrogenada, seguimiento, control o evaluación, según zonas y el posible acceso a los lotes.

Se realizaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de maíz tardío,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de fungicidas,
- siembra de girasol,
- comienzo de siembra de maíz temprano (de primera),
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, temperaturas medias, despejado, parcialmente nublado, progresivamente aumentaría la nubosidad y a mediado o fines del jueves, probabilidades de precipitaciones débiles, de bajas intensidades, lloviznas que alternarían con horas de estabilidad y soleado, hasta mediado o fines, del lunes 31.

Luego, cambiaría a cielo despejado, estabilidad, buen tiempo y con descenso de las temperaturas, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 6 a 20 °C y máximos de 17 a 30 °C.

TRIGO

Los trigales, evolucionaron en su ciclo de manera normal, dadas las óptimas características de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Se mantuvo el área de cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y anegamientos de las parcelas. Por lo que, presentaron cambios en la coloración, de un verde intenso pasaron a un verde - amarillento.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración, pero sí se realizaron puntualmente aplicaciones preventivas de fungicidas, por el período muy húmedo registrado.



♦ Lote con trigo; variedad ciclo largo, excelente estado, en desarrollo vegetativo, en el centro del departamento Castellanos.

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo - producto.

Cuadro N° 1: situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 25/8/2026

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo y macollaje.

Agua Útil (AU) (00 - 20 cm)

En la superficie total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, las condiciones de inestabilidad climática, altos porcentajes de humedad, nuevas precipitaciones débiles, lloviznas, en toda la superficie evaluada mantuvieron los escenarios con encharcamientos o anegamientos, en las distintas posiciones topográficas, en el área de los departamentos del sur, centro y norte del SEA.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 - 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían, las distintas y variables planificaciones de la cosecha gruesa 2026 - 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro - norte de la Provincia de Santa Fe.